

ECHELLE DES ADAPTATIONS POUR UNE PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE EN ODONTOLOGIE (APECS)

Consignes d'utilisation :

Cette échelle est à remplir à la fin de chaque séance pour chaque patient, avec ou sans situation de handicap. Pour chaque domaine, cochez dans la colonne de droite la case correspondant à la situation du patient (une seule case par domaine).



Adaptation de la prise en charge	DOMAINES pouvant nécessiter une adaptation de la prise en charge pour permettre l'accès aux actes diagnostiques, préventifs et thérapeutiques en santé bucco-dentaire	
DOMAINE DE LA COMMUNICATION		
Aucune	Pas de problème de communication	<input type="checkbox"/>
Mineure	Ex. Communication interpersonnelle lente ; Troubles cognitifs mineurs ; Malentendant ; Malvoyant ; Troubles de l'élocution ou de la communication verbale	<input type="checkbox"/>
Modérée	Ex. Communication par l'intermédiaire d'une tierce personne ; Troubles cognitifs modérés ; Surdit� ; Cécit�	<input type="checkbox"/>
Majeure	Ex. Pas de communication ; Troubles cognitifs s�v�res ; D�mence s�v�re	<input type="checkbox"/>
DOMAINE DES PROCEDURES FACILITATRICES (s�dation consciente / hypnose / AG)		
Aucune	Aucune proc�dure facilitatrice n'est n�cessaire pour r�aliser l'examen ou les soins	<input type="checkbox"/>
Mineure	Besoin de pr�m�dication orale pour r�aliser l'examen ou les soins	<input type="checkbox"/>
Mod�r�e	Besoin de s�dation consciente ou d'hypnose pour r�aliser l'examen ou les soins	<input type="checkbox"/>
Majeure	Besoin d'une anesth�sie g�n�rale ou d'une s�dation profonde en pr�sence d'un m�decin anesth�siste, quelle que soit l'indication	<input type="checkbox"/>
DOMAINE DE LA COOPERATION pendant l'examen ou le soin (avec ou sans technique facilitatrice) (voir annexe 1*)		
Aucune	D�tendu ; Coop�rant	<input type="checkbox"/>
Mineure	Mal � l'aise ; Tendu ; La continuit� th�rapeutique est pr�serv�e mais avec beaucoup d'anxi�t�	<input type="checkbox"/>
Mod�r�e	R�ticent ; Manifestation de l'opposition verbalement ou avec les mains ; La s�ance se d�roule avec difficult�s	<input type="checkbox"/>
Majeure	Tr�s perturb� ou totalement d�connect� ; La s�ance est r�guli�rement interrompue ; R�actions de fuite, S�ance avec contention ou pr�matur�ment stopp�e	<input type="checkbox"/>
DOMAINE DE L'ETAT DE SANTE GENERALE (voir annexe 2**)		
Aucune	Patient en bonne sant� g�n�rale	<input type="checkbox"/>
Mineure	Patient pr�sentant au moins une maladie syst�mique l�g�re ou bien �quilibr�e	<input type="checkbox"/>
Mod�r�e	Patient pr�sentant au moins une maladie syst�mique mod�r�e ou s�v�re	<input type="checkbox"/>
Majeure	Patient pr�sentant au moins une maladie syst�mique s�v�re mettant en jeu le pronostic vital	<input type="checkbox"/>
DOMAINE DE L'ETAT DE SANTE BUCCO-DENTAIRE		
Aucune	Pas de facteur de risque particulier induisant un mauvais �tat bucco-dentaire	<input type="checkbox"/>
Mineure	Pr�sence d'un facteur de risque uniquement en lien avec une hygi�ne d�faillante ou une alimentation sucr�e	<input type="checkbox"/>
Mod�r�e	Pr�sence d'un facteur de risque mod�r� en lien avec un syndrome, une dysmorphologie, ou une maladie, ex. Troubles de la d�glutition ; Fente labiopalatine ; Gastrostomie ; Trach�otomie ; Limitation de l'ouverture buccale, Spasticit�	<input type="checkbox"/>
Majeure	Association de plusieurs facteurs de risque en lien avec un syndrome, une dysmorphologie, ou une maladie ET en lien avec une hygi�ne d�faillante ou une alimentation sucr�e	<input type="checkbox"/>
DOMAINE DE L'AUTONOMIE		
Aucune	Pas de perte d'autonomie pour acc�der aux soins dentaires	<input type="checkbox"/>
Mineure	Besoin d'une assistance hors du cabinet dentaire ex. prises de rdv ; transport par un tiers (parent, VSL, taxi) ; fauteuil roulant	<input type="checkbox"/>
Mod�r�e	Besoin d'un accompagnateur pendant les soins ex. aide aux transferts ; � la prise en charge comportementale ; � la communication	<input type="checkbox"/>
Majeure	Ex. Besoin d'�tre port� lors des transferts ; Interruption de la continuit� des soins � cause d'hospitalisations/�pisodes aigus fr�quents ; Besoin de plusieurs accompagnateurs lors des soins	<input type="checkbox"/>
DOMAINE DE LA GESTION MEDICO-ADMINISTRATIVE (ex. constitution du dossier m�dical ; lien avec l'�tablissement, la famille, l'assistant social ; contact avec la tutelle)		
Aucune	Pas de gestion m�dico-administrative particuli�re	<input type="checkbox"/>
Mineure	La gestion m�dico-administrative est faite par une tierce personne (famille, assistant social, �tablissement, m�decin traitant...) ou dans le cadre d'une proc�dure de t�l�m�decine bucco-dentaire	<input type="checkbox"/>
Mod�r�e	La gestion m�dico-administrative est faite par le chirurgien-dentiste avec un seul secteur (m�dical, m�dico-social ou m�dico-l�gal)	<input type="checkbox"/>
Majeure	La gestion m�dico-administrative est faite par le chirurgien-dentiste avec et entre plusieurs secteurs (m�dical, m�dico-social et/ou m�dico-l�gal)	<input type="checkbox"/>

*Voir Echelle de Venham in extenso en annexe 1

**Voir Echelle ASA in extenso en annexe 2

ECHELLE DES ADAPTATIONS POUR UNE PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE EN ODONTOLOGIE (APECS)

Annexe in extenso 1

Score	Echelle de VENHAM modifiée*
0	Détendu , souriant, ouvert, capable de converser, meilleures conditions de travail possibles. Adopte le comportement voulu par le dentiste spontanément, ou dès qu'on le lui demande.
1	Mal à l'aise, préoccupé . Pendant une manœuvre stressante, peut protester brièvement et rapidement pour montrer son inconfort. Les mains restent baissées ou sont partiellement levées pour signaler l'inconfort. L'e patient est disposé à – et capable de – exprimer ce qu'il ressent quand on le lui demande. Expression faciale tendue. Respiration parfois retenue. Capable de bien coopérer avec le dentiste.
2	Tendu . Le ton de la voix, les questions et les réponses traduisent l'anxiété. Pendant une manœuvre stressante, protestations verbales, pleurs (discrets), mains tendues et levées, mais sans trop gêner le dentiste. Le patient interprète la situation avec une exactitude raisonnable et continue d'essayer de maîtriser son anxiété. Les protestations sont plus gênantes. Le patient obéit encore lorsqu'on lui demande de coopérer. La continuité thérapeutique est préservée.
3	Réticent à accepter la situation thérapeutique, a du mal à évaluer le danger. Protestations énergiques, pleurs. Utilise les mains pour essayer de bloquer les gestes du dentiste. Protestations sans commune mesure avec le danger ou exprimée bien avant le danger. Parvient à faire face à la situation, avec beaucoup de réticence. La séance se déroule avec difficultés.
4	Très perturbé par l'anxiété et incapable d'évaluer la situation. Pleurs véhéments sans rapport avec le traitement. Importantes contorsions, nécessitant parfois une contention. Le patient peut être accessible à la communication verbale et finir, après beaucoup d'efforts et non sans réticence, à essayer de se maîtriser. La séance est régulièrement interrompue par les protestations.
5	Totalement déconnecté de la réalité du danger. Pleure à grands cris, se débat ; inaccessible à la communication verbale. Quel que soit l'âge, présente des réactions primitives de fuite. Tente activement de s'échapper. Contention indispensable.

*Hennequin et al. French versions of two indices of dental anxiety and patient cooperation. Eur Cells Mater, 2007; 13: 3

Annexe in extenso 2

ASA PS Classification**

American Society of Anesthesiologists

Score	Définition	Exemples, non exclusifs:
ASA I	Patient en bonne santé	Bon état général, non-fumeur, pas ou peu de consommation d'alcool
ASA II	Patient présentant une maladie systémique mineure ou bien équilibrée	Maladie mineure sans limitation fonctionnelle importante. Exemples non-exclusifs : tabagisme, consommation sociale d'alcool, grossesse, obésité (30 < IMC < 40), diabète équilibré, hypertension artérielle contrôlée, insuffisance respiratoire mineure
ASA III	Patient présentant une maladie systémique modérée ou sévère	Limitation fonctionnelle importante ; Une ou plusieurs maladies modérées à sévères. Exemples non-exclusifs : diabète non équilibré, hypertension artérielle non- contrôlée, insuffisance respiratoire modérée, obésité morbide (IMC ≥40), hépatite active, dépendance à l'alcool, port de pacemaker, insuffisance rénale avec dialyse régulière, antécédent datant de > 3 mois d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébrale, d'accident ischémique transitoire ou d'insuffisance coronaire ayant nécessité la pose de stent
ASA IV	Patient présentant une maladie systémique sévère mettant en jeu le pronostic vital	Exemples non-exclusifs : antécédent datant de < de 3 mois d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébrale, d'accident ischémique transitoire ou d'insuffisance coronaire ayant nécessité la pose de stent, d'ischémie cardiaque, de dysfonction valvulaire sévère, sepsis, coagulation intravasculaire disséminée, insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance rénale terminale sans dialyse

** disponible à : www.asahq.org/standards-and-guidelines/asa-physical-status-classification-system